

LINEZOLIDE (ZYVOXID*) COMPRIME

Attention ! Ce médicament n'est pas disponible dans les pharmacies de ville. Vous devez vous le procurer à l'unité de rétrocession de la pharmacie avant de quitter l'hôpital Lariboisière

Hôpital Lariboisière, Pharmacie, Unité de rétrocession, secteur bleu, porte 5 (porte Pierre Gauthier) à côté de l'entrée principale de l'hôpital.
Horaires d'ouverture : Lundi + mardi + jeudi + vendredi De 9H10 à 12H45 et 14h00 à 16H. Attention ! l'unité de rétrocession est fermée le mercredi.

Comment bien prendre le linezolide

Prenez le linezolide avec de l'eau avant, pendant ou après le repas.

Si vous oubliez de prendre ce médicament, prenez-le dès que vous vous en rendez compte. Si vous vous en apercevez à la prise suivante, ne prenez pas de dose double.

Pendant le traitement par linezolide, ne buvez pas de grande quantités d'alcool, ne mangez pas de grandes quantités de fromages affinés, d'extraits de levure ou de soja.

Très important !

Des examens au laboratoire d'analyses médicales vous sont prescrits au moins une fois par semaine. Vous devez impérativement faire ces examens qui permettent de vérifier que le traitement n'entraîne pas de complications.

N'arrêtez pas le traitement avant la date prévue, même si vous avez l'impression que ça va mieux. La bactérie est encore présente dans votre organisme et nécessite un traitement prolongé par le médicament.

Grossesse

L'usage du linezolide est insuffisamment documenté pendant la grossesse. L'usage de ce médicament est à éviter pendant la grossesse. Contactez-nous si vous apprenez que vous êtes enceinte.

Arrêtez le traitement et appelez-nous (tel 01.49.95.65.65 puis poste 55237) ou contactez votre médecin traitant si vous avez un des signes suivants pendant le traitement :

Membres

Perte de sensibilité, sensation de brûlure, de fourmillement ou de picotement dans les bras ou les jambes.

Ventre

Des diarrhées modérées et sans gravité sont possibles et vous pouvez continuer à prendre le médicament. Mais si ces diarrhées deviennent très intenses, si vos selles contiennent du sang ou du mucus, si vous avez de la fièvre, appelez-nous.

Système nerveux

Confusion, troubles de la mémoire, sensation de malaise avec fatigue musculaire.

Consultez la notice qui se trouve dans la boîte pour connaître les autres effets indésirables possibles, plus rares mais parfois graves.

Arrêtez le traitement et appelez le 15 (urgences médicales) si vous avez un des signes suivants très rares pendant le traitement :

Visage et cou

Gonflement rapide des lèvres, du visage, de la gorge, de la langue, difficulté à avaler ou à respirer (appelez le 15).

Peau

Boutons qui apparaissent brutalement sur le visage puis sur le corps, fièvre, ganglions, taches rougeâtre sur le buste, cloques, douleur, bouche, gorge, nez, organes génitaux ulcérés, yeux rouges et gonflés (appelez le 15).

Si vous vous posez une question, si vous ressentez un effet indésirable, appelez-nous ou parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ne prenez aucun autre médicament sans avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Gardez la notice qui se trouve dans la boîte de médicament. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Octobre 2023

[PDF](#)