

CIPROFLOXACINE (CIFLOX*) COMPRIME

Comment bien prendre la ciprofloxacine

Prenez les comprimés de ciprofloxacine avec de l'eau. Si vous avez des difficultés à avaler le comprimé, vous pouvez le couper en deux. Si vous oubliez de prendre un comprimé, prenez le comprimé oublié dès que vous vous en rendez compte. Si vous vous en apercevez à la prise suivante, ne prenez pas de dose double.

Très important !

Des examens au laboratoire d'analyses médicales vous sont prescrits. Vous devez impérativement faire ces examens qui permettent de vérifier que le traitement n'entraîne pas de complications.

N'arrêtez pas le traitement avant la date prévue, même si vous avez l'impression que ça va mieux. La bactérie est encore présente dans votre organisme et nécessite un traitement prolongé.

Grossesse

Par prudence, l'usage de ce médicament est à éviter si possible pendant la grossesse. Contactez-nous si vous apprenez que vous êtes enceinte.

Arrêtez le traitement et appelez-nous (infectiologie Lariboisière 01.49.95.65.65 puis poste 55237) ou contactez votre médecin traitant si vous avez un des signes suivants pendant le traitement :

Tendons

Douleur au niveau d'un tendon, en particulier de la cheville, éventuellement poignet, coude, épaule, genou. Douleur et gonflement au niveau des articulations.

Nerfs

Perte de sensibilité, sensation de brûlure, de fourmillement ou de picotement dans les bras ou les jambes, engourdissement, faiblesse musculaire.

Ventre

Des diarrhées modérées et sans gravité sont possibles et vous pouvez continuer à prendre le médicament. Mais si ces diarrhées deviennent très intenses, si vos selles contiennent du sang ou du mucus, si vous avez de la fièvre, arrêtez le médicament et appelez-nous.

Consultez la notice qui se trouve dans la boîte pour connaître les autres effets indésirables possibles.

Arrêtez le traitement et appelez le 15 (urgences médicales) si vous avez un des signes suivants très rares pendant le traitement :

Visage et cou

Gonflement rapide des lèvres, du visage, de la gorge, de la langue, difficulté à avaler ou à respirer (appelez le 15).

Peau

Boutons qui apparaissent brutalement sur le visage puis sur le corps, tâches rougeâtres sur le buste, cloques, fièvre, ganglions, douleur, ulcération de la bouche, gorge, nez, organes génitaux, yeux rouges et gonflés (appelez le 15).

Cœur et vaisseaux sanguins

Douleur soudaine et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos (appelez le 15).

Si vous vous posez une question, si vous ressentez un effet indésirable, appelez-nous ou parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ne prenez aucun autre médicament sans avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Gardez la notice qui se trouve dans la boîte de médicament ; vous pourriez avoir besoin de la relire.

Octobre 2023